

LES INFECTIONS VAGINALES (VAGINITES)^{1,2}

	CANDIDOSE	VAGINOSE BACTERIENNE	TRICHOMONASE
Transmission	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elle n'est habituellement pas considérée comme transmise sexuellement 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elle n'est habituellement pas considérée comme transmise sexuellement 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmise sexuellement
Signes et symptômes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asymptomatique dans 20% des cas ■ Picotements ■ Dysurie (gêne à la miction) externe ■ Dyspareunie superficielle ■ Démangeaisons ■ Sensations de brûlure au niveau des organes génitaux ■ Pertes blanches, en grains ou en mottes (épaisse) ■ Érythème et œdème (rougeur et enflure) du vagin et de la vulve ■ L'infection à levure peut se manifester au niveau du gland du pénis à la suite d'un contact avec un vagin infecté (symptomatique ou non). Ces manifestations peuvent être : démangeaisons, points rouges à l'extrémité du pénis, peau sèche qui pèle et occasionnellement, sensation de brûlure à la miction. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asymptomatique dans 50% des cas ■ Pertes vaginales ■ Odeur de poisson ■ Pertes abondantes, fines, blanches ou grises 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asymptomatique dans 50% des cas ■ Pertes vaginales ■ Picotements ■ Dysurie (gêne à la miction) ■ Pertes beiges ou jaunes, écumeuses ■ Érythème de la vulve et du col de l'utérus ■ Les hommes sont souvent asymptomatiques. S'ils ont des manifestations, elles peuvent être : rougeurs ou irritations au niveau du méat urinaire. Sensations de brûlure au moment de la miction ou de l'éjaculation.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antifongiques en ventre libre ou médicament par voie orale prescrit dans certains cas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antibiotiques oraux ou vaginaux 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Métronidazole (antibiotiques)
Autres informations	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les trois quarts des femmes contractent au moins une fois dans leur vie une candidose. ■ La levure est normalement présente dans le vagin. Lorsque la levure prolifère à l'excès, une candidose peut se développer. Causes de la prolifération : grossesse, antibiotiques, activité sexuelle, diabète, affaiblissement du système immunitaire, rétention d'humidité au niveau des organes génitaux. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elle est plus courante chez les femmes actives sur le plan sexuel et est associée à l'activité sexuelle. ■ Elle peut toutefois se manifester chez les femmes vierges. ■ La mauvaise odeur peut s'amplifier à la suite de relations sexuelles. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Micro-organisme présent dans l'urètre, la vessie, le vagin, le col de l'utérus ou sous le prépuce.

¹AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008). *Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement*, édition 2008. Ottawa, ON, chapitre IV « Pertes vaginales (Vaginose bactérienne, Candidose vulvo-vaginale, Trichomonase) », p.3

²SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES DU CANADA, (2011). « Comprendre les infections transmissibles sexuellement », deuxième édition.